

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Inzenden scores

Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het programma Wolf.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de Citogroep.

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een toets of in het antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO).

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan worden.

3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:


1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken.

Lichaam met zeven vlakken

Maximumscore 4

1 □




- De twee ontbrekende vlakken zijn gelijkbenige driehoeken met zijden 5, 5 en $3\sqrt{2}$ 2
- het tekenen van de driehoeken BEG en DEG van 5 bij 5 bij $3\sqrt{2} \approx 4,2$ cm 2
- of
- het tekenen van driehoek BEG door omcirkelen van BE om B en van AC om E 2
- het tekenen van driehoek DEG op eenzelfde manier 2

Maximumscore 5

- 2 □ • $\alpha = \angle MBS$, waarbij M het midden is van EG en S het midden is van BD 2
- $BS = 1\frac{1}{2}\sqrt{2}$ ($\approx 2,12$) 1
- $\tan \alpha = \frac{4}{1\frac{1}{2}\sqrt{2}}$ geeft $\alpha \approx 62^\circ$ 2

Maximumscore 4

3 □



- K valt in het bovenaanzicht samen met A en E ; N valt samen met C en G 1
- De punten L, M, O en P zijn de middens van achtereenvolgens EB, BG, GD en DE 2
- het tekenen van de zeshoek $KLMNOP$ 1

Antwoorden	Deel-scores
------------	-------------

Maximumscore 5

- 4 □ • De oppervlakte is het verschil van 9 en $2 \times$ oppervlakte rechthoekig driehoekje van x bij x 2
 • $9 - x^2 = 5$ geeft $x = 2$ 1
 • Dus de hoogte is $\frac{2}{3} \cdot 4 = 2\frac{2}{3}$ 2

Vierkant

Maximumscore 3

- 5 □ • $1 - x^2 = x$ geeft $x \approx 0,618$ 2
 • Dus T is het punt $(0,618; 0,618)$ 1

Maximumscore 6

- 6 □ • De lengte L van QR is $(1 - p^3) - (1 - p^2)$ 1
 • $L = p^2 - p^3$ 1
 • L is maximaal als $L'(p) = 0$ 1
 • $L'(p) = 2p - 3p^2$ 1
 • $p = \frac{2}{3}$ 2

Maximumscore 4

- 7 □ • Een formule van de raaklijn is $y = -10x + 10$ 2
 • $-10x + 10 = 1$ geeft $x = 0,9$ 1
 • $S = (0,9; 1)$ 1
 of
 • De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is -10 1
 • 1 omhoog komt dus overeen met 0,1 naar links 2
 • $S = (0,9; 1)$ 1

Maximumscore 5

- 8 □ • $k'(x) = -n \cdot x^{n-1}$ 1
 • De raaklijn in A heeft richtingscoëfficiënt $k'(1) = -n$ 1
 • $SB = \frac{1}{n}$ 2
 • $\frac{1}{n} < 0,001$ geeft $n > 1000$ 1

Maximumscore 5

- 9 □ • Het verschil van de x -coördinaten is 0,1 als $1 - 0,9^n = 0,9$ 2
 • Dit geeft $n \approx 21,85$ 2
 • Het antwoord: $n \geq 22$ 1
 of
 • Op de GR voor verschillende waarden van n het snijpunt van de grafiek van k met de lijn $y = x$ berekenen
 • Voor $n = 21$ is het snijpunt ongeveer $(0,8973; 0,8973)$ 2
 • Voor $n = 22$ is het snijpunt ongeveer $(0,9004; 0,9004)$ 1
 • Het antwoord: $n \geq 22$ 1

Hartfrequentie

Maximumscore 4

- 10 □ • Twee punten van de lijn zijn bijvoorbeeld (10,2; 120) en (15, 159) 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{39}{4,8} \approx 8,1$ 1
- Een formule is: $H = 8,1 V + 37$ 2

Opmerking

Als met behulp van andere punten die bij benadering op de rechte lijn liggen, een andere richtingscoëfficiënt is gevonden tussen 7,5 en 8,5, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 5

- 11 □ • Voor $V < 17$ is de helling gelijk aan 6,6 1
- Voor $V > 17$ is $\frac{dH}{dV} = 0,0545 \cdot (0,0545V - 0,836)^{-2}$ 2
- $V = 17$ geeft $\frac{dH}{dV} \approx 6,65$ 1
- De hellingen zijn ongeveer gelijk 1

Opmerkingen

Als het antwoord gevonden is met een benadering van de afgeleide (bijvoorbeeld op de GR), hoogstens twee punten toekennen.

De conclusie dat de hellingen niet ongeveer gelijk zijn ook goed rekenen.

Maximumscore 4

- 12 □ • Bij $V = 20$ geeft de formule $H \approx 196,1$ 2
- Bij $H_{\max} = 196,1$ geeft de vuistregel $L \approx 26,6$ 2

Opmerking

Als de waarde van H is afgelezen uit de grafiek, voor deze vraag hoogstens drie punten toekennen.

Een logaritmische functie

Maximumscore 3

- 13 □ • Het domein van $x \rightarrow 2 \ln(x + 1)$ is $\langle -1, \rightarrow \rangle$ 1
- Het domein van $x \rightarrow \ln(2 - 2x)$ is $\langle \leftarrow, 1 \rangle$ 1
- Dus het domein van f is $\langle -1, 1 \rangle$ 1

Maximumscore 4

- 14 □ • $f'(x) = \frac{2}{x+1} + \frac{-2}{2-2x}$ 2
- $f'(x) = 0$ geeft $x = \frac{1}{3}$ 2

Compactheid**Maximumscore 5**

- 15 • De afstand van de top van de piramide tot een zijde van het grondvlak is $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 2
 • De oppervlakte van de piramide is $36 + 4 \cdot 15 = 96$ 2
 • De inhoud van de piramide is $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$ 1

Maximumscore 5

- 16 • inhoud gebouw = inhoud bol = 58,5 1
 • $\frac{4}{3}\pi r^3 = 58,5$ geeft $r \approx 2,41$ 2
 • oppervlakte bol $\approx 72,88$ 1
 • $C \approx \frac{72,88}{96} \approx 0,759$ 1

Maximumscore 5

- 17 • oppervlakte kubus = $6k^2$ 1
 • inhoud kubus = k^3 1
 • Invullen geeft $\frac{4,84 \cdot (k^3)^{\frac{2}{3}}}{6k^2} = \frac{4,84k^2}{6k^2}$ 2
 • Dit geeft $C \approx 0,81$ 1

*Opmerking**Als alleen een getallenvoorbeeld is gegeven, hiervoor geen punten toekennen.***Maximumscore 7**

- 18 • De inhoud van de benedenverdieping is $60x$ 1
 • De inhoud van de zolderverdieping is 120 2
 • $C = \frac{4,84 \cdot (60x + 120)^{\frac{2}{3}}}{184 + 32x}$ 2
 • C is maximaal 0,8 voor $x = 5,5$ 2

Einde